



GRAP

Prof. Dr. Bettina Schmitz
Vivantes Humboldt-Klinikum
Klinik für Neurologie
mit Stroke Unit und Zentrum für Epilepsie
Am Nordgraben 2
13509 Berlin

Bogen C

BEURTEILUNG DES SCHWANGERSCHAFTSVERLAUFS IM ZWEITEN TRIMENON

Erhebung der Daten nach Abschluss des zweiten Trimenons (26. SSW)

12	<p>Wurden weitere Medikamente im zweiten Trimenon eingenommen?</p> <p>Wenn ja, machen Sie bitte nähere Angaben im Bemerkungsfeld.</p>																																											
13	<p>Antiepileptikaeinnahme im zweiten Trimenon</p> <p>0 nein 1 ja 9 unklar</p>																																											
14	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Substanzname(n) des zu Beginn des zweiten Trimenons eingenommenen Antiepileptikums</th> <th>Tagesgesamtosis in mg</th> <th>Höchste Einzelgabe pro Tag in mg</th> <th>Anzahl d. Verabreichungen pro Tag</th> <th>Wann wurde mit der Einnahme des Antiepileptikums begonnen?</th> <th>Wann wurde die Einnahme des Antiepileptikums evtl. beendet?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AED 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AED 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AED 3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AED 4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AED 5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Substanzname(n) des zu Beginn des zweiten Trimenons eingenommenen Antiepileptikums	Tagesgesamtosis in mg	Höchste Einzelgabe pro Tag in mg	Anzahl d. Verabreichungen pro Tag	Wann wurde mit der Einnahme des Antiepileptikums begonnen?	Wann wurde die Einnahme des Antiepileptikums evtl. beendet?	AED 1							AED 2							AED 3							AED 4							AED 5							
	Substanzname(n) des zu Beginn des zweiten Trimenons eingenommenen Antiepileptikums	Tagesgesamtosis in mg	Höchste Einzelgabe pro Tag in mg	Anzahl d. Verabreichungen pro Tag	Wann wurde mit der Einnahme des Antiepileptikums begonnen?	Wann wurde die Einnahme des Antiepileptikums evtl. beendet?																																						
AED 1																																												
AED 2																																												
AED 3																																												
AED 4																																												
AED 5																																												
15	<p>Wurde die Tagesgesamtosis im Verlauf des zweiten Trimenons verändert?</p> <p>0 nein 2 ja, reduziert 9 unklar 1 ja, erhöht 3 ja, reduziert und erhöht</p>																																											
16	<p>Falls eine Änderung vorgenommen wurde, aus welchem Grund?</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 Anfallsrezidiv</td> <td>5 hoher Serumspiegel</td> </tr> <tr> <td>2 Intoxikation</td> <td>6 ärztlich indizierte Reduktion zur Vermeidung des Fehlbildungsrisikos</td> </tr> <tr> <td>3 niedriger Serumspiegel und Anfallsrezidiv</td> <td>7 Non-Compliance</td> </tr> <tr> <td>4 niedriger Serumspiegel ohne Anfallsrezidiv</td> <td>9 unklar</td> </tr> </tbody> </table>	1 Anfallsrezidiv	5 hoher Serumspiegel	2 Intoxikation	6 ärztlich indizierte Reduktion zur Vermeidung des Fehlbildungsrisikos	3 niedriger Serumspiegel und Anfallsrezidiv	7 Non-Compliance	4 niedriger Serumspiegel ohne Anfallsrezidiv	9 unklar																																			
1 Anfallsrezidiv	5 hoher Serumspiegel																																											
2 Intoxikation	6 ärztlich indizierte Reduktion zur Vermeidung des Fehlbildungsrisikos																																											
3 niedriger Serumspiegel und Anfallsrezidiv	7 Non-Compliance																																											
4 niedriger Serumspiegel ohne Anfallsrezidiv	9 unklar																																											
17	<p>Frequenz von primär und sekundär generalisiert tonisch-klonischen Anfällen im zweiten Trimenon</p> <p>0 keine 3 wöchentlich 9 unklar 1 <1/Monat 4 > wöchentlich 2 monatlich 5 täglich</p>																																											
18	<p>Frequenz von anderen Anfällen im zweiten Trimenon</p> <p>0 keine 3 wöchentlich 9 unklar 1 <1/Monat 4 > wöchentlich 2 monatlich 5 täglich</p>																																											
19	<p>Status epilepticus im zweiten Trimenon</p> <p>0 nein 2 konvulsiv 9 unklar 1 non-konvulsiv</p>																																											

